

A. HISTORIA CLÍNICA FAST.

¿Hay señales de isquemia crítica aguda o crónica en los miembros?

- El triaje de las 6 P: PAIN, PALLOR, PULSELESSNESS, PARALYSIS, PARESTHESIA, POIKILOthermia.
- Palpación de pulsos periféricos.
- Retardo en el llenado capilar distal > 3 seg.
- Pruebas de cambios posturales. (Prueba de Buerger).
- Antecedentes como hábito tabáquico y comorbilidades como Diabetes e Hipertensión Arterial.

**B. TRIAJE MÉDICO O QUIRÚRGICO
CLASIFICACIÓN DE RUTHERFORD MODIFICADA.**

CATEGORIA		PRESENTACIÓN CLÍNICA	VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD	CONDUCTA INMEDIATA
Rutherford Modificada	Crónica Estable	Claudicación Intermitente Limitante	No Amenazada (Viable)	Manejo Médico y Referencia Programada
II	Crítica del Miembro.	Dolor De Reposo Constante Y Ulceras/Gangrena.	Amenazada Inminente (Signos de Alarma)	Evaluación Especializada Inmediata y Protección
II b	Isquemia Arterial Aguda	Presencia de Las 6 "P"	Perdida Irreversible (Anestesia total, Parálisis, No Pulso Doppler).	Abordaje quirúrgico urgente (Emergencia Revascularización)

C. PROTOCOLO OPERATIVO DE MANEJO.

Todo paciente con diagnóstico de EAP previo debe continuar su medicación según recursos existentes en el área de desastre y vigilar evolución.



Individuos con Isquemia Crítica de miembros, que presenten úlceras o gangrenas localizadas, se debe colocar el miembro en reposo, protegerlo con venda de gasa, iniciar anticoagulación, antiagregación, estatinas y antibióticos de ser necesarios.

**CRITERIO PRIORITARIO DE TRASLADO**

Todo paciente con **ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA**, o pérdida sensorial o motora (Rutherford IIb), tienen prioridad máxima de traslado.

D. ABORDAJE TERAPEUTICO.

ANTICOAGULANTES PARENTERALES: dosis y equivalencia.

Heparina Sódica: 60 a 80 UI/Kg en bolo EV	Enoxaparina 60 mg/24 horas SC
---	-------------------------------

ANTIICOAGULANTES ORALES: dosis y equivalencia


Rivaroxabán 10 mg OD	Apixabán 2,5 mg /12 horas	Dabigatrán 15 mg/12 horas	Endoxabán 30mg OD
----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

ANTIAGREGANTES Y HEMORREOLÓGICOS: dosis y equivalencias

Aspirina 81 a 325 mg OD	Clopidogrel 75 mg OD	Cilostazol 50 a 100mg /12 horas	Pentoxifilina 400mg /12 horas
-------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------

ESTATINAS: dosis y equivalencias

Atorvastatina 20 a 80 mg	Fluvastatina 20 a 80 mg	Lovastatina 10-80 mg	Pravastatina 10 -80 mg	Simvastatina 10 a 40 mg
--------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------



Debe vigilarse TFG y TTP para ajustes de medicación.